Constantin Hering
Führende Leitsymptome - Teil 2 (Camph. bis Helon.)

Extrait du livre

Führende Leitsymptome - Teil 2 (Camph. bis Helon.)
de Constantin Hering
Éditeur : Barthel Verlag

http://www.editions-narayana.fr/b903

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

Guarana

Brasilianische Cocoa

Sapindaceae

Ein in Brasilien beheimateter Kletterstrauch, dessen Samen Coffein enthält und von den Eingeborenen als Erfrischungsgetränk benutzt wird. Die alkoholische Lösung der getrockneten Paste wird aus den Samen hergestellt wurde.
Eingeführt wurde sie von Gavrelle, der sie nützlich bei „Durchfall bei Phthisis, Übelkeitskopfschmerz, Lähmung, langsamer Genesung und als allgemeines Tonikum befand". U. S. D. Die Prüfung stammt von Macdowell (siehe Allen's Encyclopedia, Bd. 4, S. 511).
Quellen: *Kopfschmerz,* Bradley, Hom. Rev., Bd. 16, S. 504; *Migräne,* Raue's Rec., 1873, S. 34; *Palliativum bei Migräne,* Müller, Trinks, B. J. H., Bd. 21, S. 20, 284; *Durchfall, Dysenterie,* Raue's Rec., 1873, S. 34.

Gemüt[1].
- Heiterkeit; extravagantes Verhalten.
- Geistige Hyperästhesie; geistige Erregung.

Innerer Kopf.
❹ Übelkeitskopfschmerz bei Personen, die Tee und Kaffee übermäßig genossen haben, oder bei nervösen Kopfschmerzen, gefolgt von Erbrechen, die durch jeden Ernährungsfehler oder geistige Niedergeschlagenheit ausgelöst werden.
❸ Häufige Anfälle von Übelkeitskopfschmerz.
❸ Migräne.

Äußerer Kopf.
❸ Pochender, kongestiver Kopfschmerz nach übermäßigem Alkoholgenuß. **Sehen und Augen[5].**
- Ständiges Zucken der Augenlider.

Appetit, Durst. Verlangen, Abneigungen".
- Appetitverlust.

Stuhl und Rektum[20].
❷ Reichliche, grüne, geruchlose, schleimige Stühle. θ Durchfall bei Kindern.
❷ Sommerdurchfall bei Kindern; Durchfall bei Zahnung; Durchfall und Erbrechen durch ungeeignete Nahrung.
❷ Cholera infantum.
❷ Chronischer Durchfall, fast bis zum Marasmus, bei einem Kind.
❷ Durchfall bei Phthisis.

Harnorgane[21].
- Blasenspasmus.

Herz, Puls und Kreislauf[29].
- Verminderung der Herzschläge.

Nervensystem[36].
- Ruhelosigkeit.

❷ Nervosität und Mattigkeit.
❷ Neuralgie.
❷ Rheumatische Neuralgie.
- Verringerte Lebenskräfte; Kummer; Niedergeschlagenheit des Geistes; Anorexie; nervöse Hemikranie.

❷ Genesung von entkräftenden Krankheiten.
❷ Lähmung.

Schlaf[37].
- Unangenehme und unkontroliierbare Schläfrigkeit, Schlaftrunkenheit und Schwere des Kopfes, mit errötetem Gesicht, bei Menschen mit sitzender Lebensweise, nach dem Essen.
- Schlaflosigkeit.

Anfälle, Periodizität[41].
- Häufige Anfälle von Übelkeitskopfschmerz.

Narayana Verlag, 79400 Kandern Tel.: 0049 7626 974 970 0
Leseprobe von Constantin Hering: Führende Leitsymptome Teil 2

Empfindungen[43].
- Rheumatische Neuralgie.
- Pochender, kongestiver Kopfschmerz.
- Zucken: der Augenlider.
- Blasenspasmus.

Gewebe[44].
❷ Chlorosis.

Haut[46].
- Urticaria, Prurigo.

Beziehungen[48].
- Vergleichsmittel: *Agar.* (bei Zukken der Augenlider); *ign., Nux-v.,* letzteres besonders bei Übelkeitskopfschmerz, etc.

Guarea trichilioides

Rotholz **Meliaceae**

Tinktur und Verreibung werden aus der Rinde hergestellt. Pathogenetische und klinische Symptome stammen von Petroz (siehe Allen's Encyclopedia, Bd. 4, S. 512).

Gemüt[1].
- Schwaches Gedächtnis.
- Gleichgültigkeit.
- Geistesangst.
- Furcht den Verstand zu verlieren.

Sensorium[2].
❷ Schwindel beim Bücken; Wirbeln beim Anblick von in Unordnung befindlichen Gegenständen.
- Summen und Empfindung, als falle das Gehirn nach vorne.
- Empfindung, wie von einem Schlag auf den Kopf, die eine Art von Betäubung, mit Verringerung der Denkfähigkeit über mehrere Tage hinteriäßt.

Äußerer Kopf[4].
- Unbeweglichkeit des Kopfes; Schwere.
- Gelbe Flecken an den Schläfen; Acne rosacea.

Sehen und Augen[5].
- Die Gegenstände erscheinen grau.
- Erweiterung der Pupillen.
- Empfindung, als wären die Augäpfel herausgedrückt worden.

❸ Chemosis, wobei die Schwellung so ausgedehnt und dick war, daß vom Auge außer der Pupille am Ende eines richtigen Ganges nichts gesehen werden konnte. θ nach Kataraktentfernung.
- Lähmung der Augenlider.

Hören und Ohren[6],
- Empfindung, als wären die Ohren verstopft, mit Nachaußendrücken.
- Ausschlag hinter den Ohren.

Geruch und Nase[7].
- Schnupfen mit verhärteter Absonderung; Hitze und vergebliche Anstrengung zum Niesen.

Obere Gesichtshälfte[8].
- Schmerz wie verbrannt; Aufgequollen unter den Augen; Schwellungen die eitern.

Untere Gesichtshälfte[9].
- Zuckungen des Mundes.
- Schwellung der Oberlippe; Pikkel, Schuppen, Risse an Lippen und Komissuren.

Zähne und Zahnfleisch[10].
- Zusammendrückender, fressender Schmerz der Zähne.

Geschmack und Zunge[11].
- Reißender Schmerz in der Zunge; Lanzinieren; Lähmung der Zunge.
- Schwere, geschwollene, blutende Zunge; grünlich-gelber Belag.
- Die Zunge fühlt sich kalt und trocken an.

Narayana Verlag, 79400 Kandern Tel.: 0049 7626 974 970 0
Leseprobe von Constantin Hering: Führende Leitsymptome Teil 2



Constantin Hering

Führende Leitsymptome - Teil 2 (Camph. bis Helon.)

1313 pages, relié
publication 2000

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr