Pommier L. / Algazi J.
Dictionnaire homéopathique d'urgence

Reading excerpt

Dictionnaire homéopathique d'urgence
of Pommier L. / Algazi J.
Publisher: Vigot



https://www.narayana-verlag.com/b14963

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
https://www.narayana-verlag.com

A

ABADIE (SIGNE D'ABADIE)

→Tendon d'Achille, §5.

ABASIE ET ABASIE-ASTASIE

En attendant le médecin, appelé d'urgence, qui soignera la perte plus ou moins complète de la faculté de marcher, sans trouble de la force musculaire ni de la sensibilité (à noter que l'Abasie coïncide habituellement avec l'Astasie, qui est la perte plus ou moins importante de la fonction de garder la station verticale).
Causes : souvent une lésion du système nerveux, due à une insuffisance de la circulation sanguine dans le cerveau, ou une lésion du labyrinthe de l'oreille. /. Conium maculatum 9 CH 5 gr. 1 fois. Curare 5 CH, Argentum nitricum 5 CH, Phy-sostigma 5 CH, Kali bromatum 5 CH, 2 gr. de chaque tube, 1 fois par 24 h.
2. S'il s'agit d'une phobie, d'une idée fixe, d'une névrose, d'angoisse :
Aux remèdes du § I ajouter ceux de l'Angoisse.
3. *Si l'abasique est hystérique :*
Psychothérapie : distraire l'attention de l'acte à exécuter, afin de rendre plus aisée l'exécution automatique des actes qui ne peuvent être exé cutés sans angoisse.
4. S'il s'agit d'une amnésie motrice, rééduca tion : essayer par tous les moyens de fixer l'atten tion du malade sur les mouvements à accomplir.

ABATTEMENT

Être abattu, au sens médical du mot, c'est éprouver une diminution notable de ses forces physiques et de ses fonctions psychiques; cet abattement peut être plus ou moins rapide, plus ou moins long. On lui reconnaît 3 groupes de causes.

1. *Causes organiques,*
Ce sont essentiellement une Fièvre grave, une Hémorragie prolongée, une maladie aiguë à son début. Traiter la cause.
2. Causes psychologiques.
Traiter : Adynamie, Dépression, Mélancolie, Neurasthénie, Névrose.
3. *Causes par surmenage.*
Intense surmenage physique ou intellectuel. → Fatigue.
4. Il convient de ne pas incriminer un temps orageux ou une fatigue anormale, surtout si cet état se prolonge ou s'il récidive : le médecin devra être consulté.
5. *En ce qui concerne un enfant,* si celui-ci est abattu, alors qu'il apparaissait habituellement gai, remuant, « vivant », il peut « couver » une fièvre, la grippe, les oreillons, une rhino-pharyngite, la rougeole, la varicelle, etc.
Le garder au lit, au chaud; prendre et noter sa température (→Fièvre) et son pouls (→ Pouls) à l'alimenter légèrement (bouillon de légumes, jus de fruits) et surveiller l'évolution : ce ne sera peut-être qu'une fausse alerte; si l'enfant présente une fièvre élevée, des troubles divers, des douleurs, une éruption, etc., le médecin devra être appelé.

ABCÈS

Collection de pus qui se forme dans les tissus (souvent le derme) ou une cavité naturelle (foie, poumons, etc.) aux dépens des tissus qui l'entourent.
Il y a 2 catégories d'abcès suivant qu'il y a, ou non, inflammation.
I. ABCÈS CHAUDS
1. Abcès chauds (en général). Abcès du tissu cellulaire sous-cutané; les traitements ci-dessous ne concernent pas les cavités osseuses non drainées, de même que les affections intra-thoraciques ou abdominales.

Extrait de « Dictionnaire homéopathique d'urgence », L. Pommier / J. Algazi Éditeur : Vigot
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

II *y* a ici : inflammation, rougeur, chaleur, tuméfaction, fièvre, douleur; la peau qui recouvre la région de l'abcès est tendue, la douleur devient plus lancinante au fur et à mesure que l'abcès mûrit. La tuméfaction résulte de l'arrivée en masse de leucocytes (globules blancs) qui s'infiltrent dans les tissus pour attaquer les microbes (souvent le staphylocoque doré, moins souvent le streptocoque; plus rarement encore le pneumocoque, le gonocoque, etc.).

Traitement des abcès chauds, en général :
Biothérapique Pyrogenium 5 CH, 2 gr., 1 h après :
Hepar Sulfur 5 CH, 2 gr, 1 h après :
Belladonna 4 CH, Apis mellifica 4 CH, 2 gr. de chaque tube, 2 fois par 24 h, en alternant.
Laroscorbine 500, ou Vitascorbol 500, 1 comprimé, 1 fois par 24 h. Oligo-éléments :
Cuivre-Or-Argent Oligosol,
1 fois par 24 h.

- *Pour faire mûrir plus rapidement l'abcès,* ajouter, en intercalant, Lachesis mutus 7 CH, 2 gr. toutes les 2 h.
- Pansement permanent avec une Pommade au Calendula (Homéoplasmine, Homéorhine, Cicaderma, etc.). Si un pansement humide semble préférable, employer la proportion d' 1 c. à café de Calendula T.M. pour un verre d'eau bouillie (ne faire le mélange qu'une fois celle-ci refroidie). Quand la résorption n'est plus possible parce que l'abcès est trop avancé, l'Onguent KLC ou, à défaut, la Pommade au Cyrtopodium (sur un panaris, par exemple) fera vider le pus rapidement; toutefois ne pas l'employer pour l'Abcès ou Furoncle du nez ou de la lèvre supérieure.

En l'absence de tout remède, utiliser des cataplasmes d'oignon cru, ou un oignon cuit au four, à appliquer à la température supportable.

- *S'il y a inflammation des vaisseaux lymphatiques,* → Lymphangite.
- *S'il y a une tendance septicémique,* aux remèdes précédents, ajouter :

Echinacea T.M., 5 gouttes dans un peu d'eau, toutes les 2 h.
Naja tripudians 4 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h.

- *Quand l'abcès est ouvert et vidé :*

Calcarea sulfurica 4 CH, Pulsatilla pratensis 5 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h en alternant.

2. Abcès de l'amygdale.
→ Phlegmon de l'amygdale.

3. Abcès dentaire et Fluxion dentaire.
- *Avant l'extraction :* consulter sans délai le stomatologiste. En attendant, utiliser les remèdes de la rubrique Dent, § 10 et 13.
- *Après l'extraction,* —* Dent, § 14.

4. Abcès du foie.
À titre de première urgence, utiliser les remèdes de l'Ictère grave.

5. Abcès du nez.
— *Abcès de la cloison du nez :* Biothérapique Pyrogenium 5 CH, 2 gr. (répé-table toutes les 24 h), 1 h après : Phosphorus triiodatus 5 CH, 2 gr. (ne pas répéter), 1 h après : Arnica montana 5 CH, 2 gr. (répétable toutes les 24 h), 1 h après : Hepar Sulfur 5 CH, 2 gr. (répétable toutes les 48 h). Pommade dans les narines, *Voir* § 1.
- *Si furoncle,* —* Furoncle du nez et de la lèvre supérieure.

6. Abcès de l'oreille (abcès du conduit auditif).
Aux remèdes des Abcès, § 1, ajouter :
Myristica sebifera 4 CH, 2 gr. 3 fois par 24 h.
Picricum acidum 5 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h.
- *Si furoncle* → Furoncle du conduit auditif.

7- Abcès du poumon.
Traité en milieu hospitalier avec les antibiotiques choisis d'après le germe en cause (Staphylocoque, Pneumocoque, Friedlander, etc.) ; cette affection pourra ensuite bénéficier, outre de la kinésithérapie (drainage de posture), de remèdes homéopathiques favorisant l'expectoration du pus : Echinacea T.M., 5 gouttes dans un peu d'eau,
2 fois par 24 h.
Biothérapique Pyrogenium 5 CH, Calcarea sulfurica 5 CH, Kreosotum 5 CH, 2 gr. 1 fois par 24 h.
Isopathique du pus 5 CH, 2 gr. 1 fois par 24 h pendant 8 jours, puis en 7 CH, 2 gr. tous les 3 jours pendant 15 jours; puis en 9 CH, 2 gr. toutes les semaines. L'alcoolisme, associé ou non au tabagisme peut être la cause d'un tel abcès.

8. Abcès du sein.
Pyrogenium 5 CH immédiatement, puis, 1 fois par 24 h.
Belladonna 4 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Apis mellifica 4 CH, Conium maculatum 5 CH, 2 gr. toutes les 2 h, dans l'ordre. Renouveler jusqu'à la consultation médicale. Vita-

Extrait de « Dictionnaire homéopathique d'urgence », L. Pommier / J. Algazi Éditeur : Vigot
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

mine C, oligo-éléments, soins, *Voir* ci-dessus I§1.

9. Abcès tubéreux de l'aisselle. (Hidrosadénite, ou Adénite sudoripare.) Petit abcès rond causé par l'inflammation d'une glande sudoripare, dans le creux de l'aisselle.

Traitement interne et régime, → Furoncle; traitement externe, *Voir* ci-dessus, I § 1.

II. ABCÈS FROIDS

1. Il n'y a ici aucun des signes d'inflammation signalés au § 1. Il s'agit souvent, au début, d'une insensible grosseur recouverte par la peau; cette grosseur l'envahit peu à peu; elle s'ulcère, il y a écoulement d'une sécrétion granuleuse, puis laisse ensuite une fistule.

Causes : Tuberculose, osseuse ou ganglionnaire, Mycose. C'est ainsi que le Mal de Pott est une tuberculose vertébrale qui peut produire des abcès froids se trouvant parfois très loin du foyer osseux original (—* Pott). S'il s'agit d'abcès froids fistulisés au cou (Ecrouelles),-> Adénite § 4.

Le traitement indiqué ci-dessous concerne un abcès ouvert ou fistulisé. Drosera 7 CH, 1 dose, 1 seule fois. Calcarea sulfurica 4 CH, Pulsatilla pratensis 4 CH, 2 gr. 2 fois par 24 h, en alternant. Silicea 5 CH, 2 gr. tous les 3 jours. Oligo-éléments : Cuivre-Or-Argent Oligosol, 1 fois par 24 h.

Localement, applications de Cistus canadensis T.M., ou compresses avec les Eaux-mères de Salies-de-Béarn. (À défaut, Calendula T.M.). Héliothérapie générale et locale. Régime substantiel. Vitamines C, D. —» Vitamines.

2. Abcès de Brodie, -» Ostéite § 6.

ABDOMEN

1. *Douleurs abdominales avec fièvre,* apparaissant brusquement et violemment sans cause apparente :

Belladonna 4 CH, 2 gr. immédiatement. Bryonia 5 CH, 2 gr. 1/2 h après. Magnesia phosphorica 5 CH, 2 gr. 1/2 après. Répéter la série.

Tout malade qui souffre du ventre depuis plusieurs heures représente bien souvent une urgence chirurgicale. *2. S'il s'agit de douleurs crampoïdes :* Comme ci-dessus ; toutefois remplacer Bryonia 5 CH par Cuprum 5 CH.

Dans les deux cas, si les douleurs persistent, appeler d'urgence le médecin. *Ne jamais purger un enfant qui a mal au ventre;* faire analyser ses urines. Noter que l'acétoné-mie peut se manifester sous une forme pseudo-appendiculaire chez l'enfant. Il peut s'agir de contractions d'un estomac encore minuscule et se dilatant encore mal au bol alimentaire. On se trouvera bien de mettre sous la langue du bébé, avant chaque repas, 2 granules de Colocynthis 5 CH et de Magnesia phosphorica 4 CH après le repas (—» Mère-enfant). *Si douleur « en coup de poignard »,* songer à la péritonite, ou à une crise tabétique gastrique, à la perforation d'un ulcère gastro-duodénal, à la rupture de grossesse extra-utérine, au début d'une pancréatite aiguë hémorragique, etc. Appeler aussitôt le médecin, chaque minute compte.

3. Rétraction abdominale,

Le ventre paraît rétracté, « en bateau », contracté, excavé. Cet état s'observe dans le Choléra et les états cholériformes, les Coliques de plomb, certaines Diarrhées épuisantes, une intolérance gastro-intestinale grave, certains états précancéreux.

a) Plumbum metallicum 5 CH 2 gr.

Hydrastis canadensis 5 CH, 2 gr. 1/2 h après.

b) *Si le foie est gros, douloureux, la salivation exagérée, avec un goût amer,* ajouter :

Ptelea trifoliata 4 CH, 2 gr. toutes les heures.

4. Traumatismes de l'abdomen.

Pour les soins d'urgence, → Écrasement des membres.

5. Dans If syndrome douloureux abdominal des premiers mois du bébé (de 15-20 jours jusqu'à 3 mois environ), il peut s'agir d'un nourrisson hypertonique qui a une mère anxieuse, animée de trop de sollicitude. → Mère-Enfant.

6. Chez le tout jeune enfant qui se plaint du ventre (douleurs diffuses, faux besoins), on pense de suite à l'Appendicite; or, il peut s'agir de rhino-pharyngite ou d'otite.

En ce qui concerne les *douleurs abdominales récurrentes de l'enfant,* celles-ci sont intermittentes, parfois quotidiennes, parfois intenses, brèves, et presque toujours autour du nombril. Très nombreuses causes (Affections vermineuses, coliques urologiques, etc.) dont le pourcentage est faible, car dans 9 cas sur 10 environ, il y a une *cause psychosomatique* qui tient à *l'enfant et* à son environnement, essentiellement : son anxiété et son introversion,

Extrait de « Dictionnaire homéopathique d'urgence », L. Pommier / J. Algazi Éditeur : Vigot
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0

son *contact familial* (mauvaise entente entre les parents, jalousie, deuil, etc.) ou *scolaire* (phobie du petit enfant dont les douleurs sont rythmées par l'école).

7. → Appendicite, Colique, Diarrhée, Diverticulite du colon, Dysménorrhée, Embarras gastrique, Hernie, § 3 (hernie étranglée), Intoxication alimentaire, Occlusion intestinale, Pancréatite, Ulcère de l'estomac, § 3, etc.

ABEILLES (PIQÛRES)

→ Piqûre d'insecte.

ABLACTATION

→ Allaitement, II.

ABOU-MOUK-MOUK (AFRIQUE CENTRALE)

Utiliser les remèdes de la Variole.

ABOULIE

Absence ou diminution de la volonté; le sujet garde les idées claires et se rend compte de ses difficultés à agir, il ne peut pas passer de l'idée à l'acte.

Causes : Troubles psychiques, Obsessions, parfois certaines Toxicomanies, à traiter. Baryta carbonica *7* CH. Causticum *7* CH, 5 gr. tous les *7* jours, en alternant. Phosphoricum acidum 5 CH, Conium macu-latum 5 CH, 2 gr. jours pairs. Acidum picricum 5 CH, Opium 5 CH, 2 gr. de chaque, jours impairs. Lépidolke D8, 1 ampoule buvable, 1 jour sur 2. Oligo-éléments, Cuivre-Or-Argent, 1 fois par 24 h, au réveil.

Traitement psychothérapique : rééducation méthodique de la volonté. Si besoin, cure à Divonne, Saint-Didier, Saujon.

ABSENCE

1. Cas légers.

Très courte suppression de la connaissance, défaillance de la mémoire, brusque inconscience; « absences » par distraction, ou préoccupation qui mobilise l'esprit, ou par léger excès de boissons alcooliques. Un peu de repos, physique, mental, ou alimentaire, remettra le sujet en forme; si besoin, un peu de psychothérapie amicale ou familiale.

L-72 Lehning, 20 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par 24 h. *2. Cas sérieux récidivants.* On retrouve les signes mentionnés à l'un des premiers états de l'Epilepsie; *Voir* cette rubrique, § I (c'est surtout dans ce cas qu'aujourd'hui on parle « d'absences »). Songer également à un trouble, passager ou non, de l'irrigation cérébrale, —> Athérosclérose, Ramollissement cérébral, Maladie d'Alzheimer.

ACARIOSE

→ Gak

ACCOUCHEMENT

- I. AVANT (PENDANT QUINZE JOURS AVANT LA DATE PRÉSUMÉE) /. *Afin de réduire les douleurs de l'accouchement,* saler très peu les aliments et diminuer peu à peu jusqu'à ne plus saler du tout. Technique psychoprophylactique pavlovienne de « l'accouchement sans douleur ». *2, A titre préventif d'infection, de phlébite et d'autres complications.* Pendant 8 jours avant la date présumée de l'accouchement :
  Biothérapique Pyrogenium 5 CH, 2 gr. au réveil. Arnica 5 CH, 2 gr. à 11 h. Cimicifuga 5 CH, 2 gr. à 16 h. Caulophyllum 4 CH, 2 gr. à 19 h. Pulsatilla 5 CH, 2 gr. au coucher. Hydrosol polyvitaminé Roche, ou Alvityl, selon la notice. Surveillance méthodique du pouls et de la température.
- II. PENDANT L'ACCOUCHEMENT
  1. Arnica 5 CH, Cimicifuga 4 CH, Colocynthis 4 CH, 2 gr. toutes les heures, en alternant. *Si grandes douleurs intolérables,* ajouter, en inter calant :
  Chamomilla 5 CH, Coffea 4 CH, 2 gr. 3 fois par 24 h.
  Au besoin, Coffea 9 CH, 1 dose.
  2. Pour faciliter la dilatation du col :
  Caulophyllum 4 CH, Cimicifuga 4 CH, 2 gr. tous les 1/4 h, en alternant.
  3. Si travail prolongé :
  Calcarea acetica 4 CH, 2 gr. toutes les 1/2 h.
  4. S'il y a des crampes musculaires :
  Cuprum 5 CH, Secale cornutum 4 CH, Phytolacca 5 CH, 2 gr. tous les 1/4 h, dans l'ordre.

Extrait de « Dictionnaire homéopathique d'urgence », L. Pommier / J. Algazi Éditeur : Vigot
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0



Pommier L. / Algazi J.

Dictionnaire homéopathique d'urgence

16e édition

580 pages, pb
publication 2012

order

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com