Barral / Croibier
Manipulation peripherer Nerven

Reading excerpt

Manipulation peripherer Nerven
of Barral / Croibier
Publisher: Elsevier Urban&Fischer Verlag



http://www.narayana-verlag.com/b11199

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

der Zeige- oder Mittelfinger leichter in die Skalenuslücke eindringen und nach einer druckempfindlichen oder verspannten Stelle suchen.
Auch eine Behandlung des M. subclavius wird in dieser Schulterposition durchgeführt. Mit Zeige- oder Mittelfinger streicht man auf der Rückseite der Klavikula entlang. Nach der oben beschriebenen Technik können empfindliche Stellen entweder von ober- oder von unterhalb mit leichtem Druck komprimiert werden, während der Plexus brachialis durch Zug in kaudaler Richtung gedehnt wird.

In der Achselhöhle

Hier befindet sich der Plexus brachialis hinter dem M. pectoralis minor, der als einziger Schultermuskel nicht am Humerus ansetzt, sondern von den Rippen (Ursprung an der 3., 4. und 5. Rippe) zum Proc. coracoideus zieht und in der Faszie endet.

Technik

In Seitenlage des Patienten zeigt die Behandlungsseite nach oben und der Therapeut arbeitet von hinten (s. Abb. 6.11).
Wie oben beschrieben, bewegt man die



Abb. 6.8:
Plexus brachialis (Sicht von kranial)



Abb. 6.9:
Manipulation des Plexus brachialis hinter dem Schlüsselbein

Leseprobe von Alain Croibier und Jean-Pierre Barral „Manipulation peripherer Nerven“
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel.: +49 7626 974 970-0



Abb. 6.10:
Plexus brachialis in der Achselhöhle (nach Gauthier-Lafaye)



Abb. 6.11:
Manipulation des Plexus brachialis in der Achselhöhle

Schulter erst nach vorn und danach in kranialer Richtung. Dann wird der Daumen in die Achsel geschoben (auf den Proc. coracoideus zu). Das geschieht in der Absicht, den Tunnel, den der kleine Brustmuskel für den Armplexus bildet, einzubeziehen, um die teilweise verkürzten oder fibrosierten Muskelfasern zu lockern und dem Plexus brachialis wieder mehr Spielraum zu geben.

Besondere Indikation

Bei Schwerarbeitern oder Bodybuildern können Mikrotraumen auftreten und zu einer Fibrosierung des M. pectoralis minor führen. Dadurch kann sich die Druckbelastung des Armplexus bei Muskelkontraktionen oder in manchen Schlafpositionen noch verstärken.

Leseprobe von Alain Croibier und Jean-Pierre Barral „Manipulation peripherer Nerven“
Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel.: +49 7626 974 970-0



Barral / Croibier

Manipulation peripherer Nerven

Osteopathische Diagnostik und Therapie

304 pages, hb
publication 2011

order

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life
www.narayana-verlag.com