

# Harimohon Choudhury


## Potencia Cincuenta Milesimal, Teoría Y Práctica

Reading excerpt

[Potencia Cincuenta Milesimal, Teoría Y Práctica](#)

of [Harimohon Choudhury](#)

Publisher: B. Jain



<http://www.narayana-verlag.com/b12729>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)

<http://www.narayana-verlag.com>



**Si se Enfrenta la Agravación Durante el Tratamiento**

Si hay alguna agravación durante el curso del tratamiento, debemos decidir si la agravación es:

- (a) Similar
- (b) No similar.

(a) **Agravación similar:** Deberá ser llamada similar si la agravación corresponde a la totalidad de los síntomas encontrados en la primera prescripción. La enfermedad de la piel se agrava en los pacientes que la sufren. El asma en un paciente asmático, la fiebre en un paciente que la padece. En estos casos deberá darse por sentado que las dosis fueron demasiado grandes. Las agravaciones debidas a este tipo de dosis grandes aparecen desde la primera dosis. Y será igual en cada dosis subsecuente.<sup>24</sup>

La agravación debida a dosis grandes desaparecerá gradualmente si la medicina se suspende por un día, dos o tres cuando mucho. Las dosis en ese caso deberán ser reducidas aún más.<sup>25</sup>

(b) **Agravación no similar:** La agravación debida a la aparición de nuevos síntomas, que no se hallaban en el paciente anteriormente pueden ser llamada agravación no similar. Si esto sucede, deberemos saber que:

- (i) No hay necesidad del medicamento de la primera prescripción.
- (ii) La primera prescripción fue errónea.
- (iii) Si tal es el caso, la historia del paciente deberá hacerse de nuevo.
- (iv) Sobre la base de la totalidad de los síntomas, para la segunda vez, deberá seleccionarse la medicina.
- (v) Si hay una agravación violenta e insoportable,

---

primero que todo dé el antídoto y prosiga con las medicinas bien seleccionadas.

- (vi) Si la agravación es tolerable, deberá administrarse una nueva medicina sin tardanza.<sup>26</sup>

(c) **Enfermedad Aguda:** Si durante el tratamiento de una enfermedad crónica irrumpe una enfermedad aguda (como -sarampión, varicela, viruela, cólera, etc., especialmente durante un período de epidemia), deberá suspenderse la medicina para la enfermedad crónica y aplicar un medicamento bien seleccionado para la etapa aguda. Después de la recuperación del trastorno agudo, deberá iniciarse nuevamente el tratamiento para la enfermedad crónica con la medicina bien seleccionada sobre la base de la totalidad de los síntomas actuales o con la medicina de la primera prescripción si los síntomas coinciden, como puede ser el caso.

El fenómeno de agravación debería ser discutido cuidadosamente porque tenemos que encarar circunstancias raras con mucha frecuencia. Debido a estas agravaciones en algunas ocasiones los pacientes nos abandonan y se van a otra escuela de medicina para su tratamiento. Esto es una desgracia para la Homeopatía. Esto sucede con más frecuencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, más que en las agudas. Es por eso que es peligroso tratar pacientes crónicos con las medicinas de escala centesimal. Esta reacción indeseable de la condición de enfermedad no aparece con la medicina de escala 50 milesimal. Si acaso hay alguna reacción, lo que es muy raro, debemos darnos cuenta que se debe a:

- (a) Dosis grandes
- (b) Elección equivocada del medicamento.

---

26. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 248-249

Este error se subsana al corregir la dosis grande con la más pequeña y el medicamento erróneamente seleccionado, con el correcto y apropiado.

La primera prescripción debería continuarse en tanto el paciente experimente una mejoría continua sin encontrar uno u otro trastorno que nunca tuvo antes en su vida. En estos casos la potencia del medicamento deberá ser cambiada a más alta, gradualmente.<sup>27</sup>

Si aparecen nuevos síntomas, "si el resto de la enfermedad aparece en un grupo de síntomas alterados, entonces otra medicina más homeopáticamente relacionada deberá ser escogida en lugar de la última y administrada en las mismas dosis repetidas."<sup>28</sup>

(d) **Agravación al Final del Tratamiento:** "Pero cuando medicinas de larga acción tienen que combatir una enfermedad de considerable, o muy largo curso, cuando un incremento aparente de la enfermedad original debería aparecer durante el tratamiento y no aparece, si el remedio cuidadosamente escogido fue dado en dosis pequeñas, apropiadas, gradualmente más altas, cada una modificada en algo con una dinamización renovada, (Aforismo 247). Tal incremento de los síntomas originales de una enfermedad crónica puede aparecer solamente al final del tratamiento cuando la cura está casi o completamente terminada"<sup>29</sup> La dosis en tal caso deberá entonces ser reducida aún más y repetida en intervalos más largos y posiblemente suspendida por varios días, para ver si el convalesciente ya no necesita una ayuda medicinal posterior."<sup>30</sup>

---

27. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 161, 248 y 281.

28. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 248.

29. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 161.

30. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 248.

---

(e) **Antídoto Durante la Agravación:** "Debe, si la agravación es considerable, ser primero parcialmente neutralizada tan pronto como sea posible con un antídoto antes de dar el siguiente remedio escogido con más exactitud, de acuerdo con la similitud de acción; o si los síntomas problemáticos no son *muy* violentos, el siguiente remedio deberá ser dado inmediatamente para que tome el lugar del seleccionado inapropiadamente."<sup>31</sup>

En conexión con esto, deberemos tener en mente que, "El médico bien informado y conscientemente precavido, nunca deberá estar en posición de requerir un antídoto en su práctica si empieza, como debería, dando el medicamento seleccionado en la dosis más pequeña posible. Una dosis diminuta de un remedio mejor seleccionado, reestablecerá el orden completamente."<sup>32</sup>


Esperamos que las razones de agravación y los pasos para la prevención durante el período de tratamiento estén ahora claros a los cultos lectores. Para evitar esta situación dañina y peligrosa deberemos ser más cautos y conscientes. La perseverancia, el trabajo duro y el amor por los oprimidos y los enfermos son los únicos prerequisites para ser médicos racionales y dinámicos.

(f) **Otras Causas de Agravación:** El medio ambiente, la atmósfera, riesgos ecológicos, irregularidades, la ingesta indiscriminada de alimentos y bebidas, etc., son otras razones para la agravación. Si estas son las causas, el modo de vida deberá cambiarse tanto como sea posible, para ayudar a la curación. El alimento, bebidas y formas de vida deberán estar bien regulados en lo posible, para que todos los obstáculos para la recuperación puedan ser eliminados.

---

31. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed., Afo. 249.

32. Hahnemann, S.: *ibid.*, pié de nota al Afo 249.



Harimohon Choudhury

[Potencia Cincuenta Milesimal, Teoría Y Práctica](#)

140 pages, pb  
publication 2010



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life [www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)