

# Aimé Holtzscherer


## Thérapeutique hormonale homéopathique

Reading excerpt

[Thérapeutique hormonale homéopathique](#)

of [Aimé Holtzscherer](#)

Publisher: CEDH



<http://www.narayana-verlag.com/b14879>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)


<http://www.narayana-verlag.com>



## C

### La prolactine

Elle est stimulée par la TRH hypothalamique (cette hormone n'existe pas à la nomenclature homéopathique) et partiellement par la LH-RH, la sérotonine et le VIP (*Vasoactive Intestinal Peptide*). Ce dernier est un neurotransmetteur vasodilatateur et régulateur de la motricité digestive, des sécrétions intestinales et stomacales et des sécrétions internes du pancréas.



- La prolactine est stimulée aussi par la succion et les stimulations du mamelon dans les deux sexes.
- Elle est inhibée par la dopamine.
- Elle a pour action principale le déclenchement et le maintien de la lactation, et contribue au maintien du corps jaune de la grossesse.
- Elle a une action frénatrice sur les hormones gonadiques dans les deux sexes.

### Usages homéopathiques

Dans toutes les indications qui vont suivre, l'utilisation de *Lac caninum* (qui contient beaucoup de prolactine mais aussi de la progestérone et des œstrogènes) peut être préférée ou être complémentaire.

**Sevrage de la nourrice qui désire arrêter d'allaiter ou chez la parturiente qui ne désire pas allaiter**

Les résultats sont régulièrement excellents en prescrivant :

- Lac can/num 15 CH, 5 granules à chaque montée laiteuse.
- En cas d'engorgement mammaire, adjoindre *Bryonia* 75 CH et *Apis mellifica* 15 CH, 5 granules de chaque 3 fois par jour.

Toutes les autres indications relèvent soit d'une hypersensibilité à la prolactine, soit d'une hyperprolactinémie vraie. Il faut donc demander le plus souvent un dosage de celle-ci et, éventuellement, une IRM de la selle turcique, à la recherche d'un adénome hypophysaire ou d'une déconnexion de la tige hypothalamo-hypophysaire. Même en cas de microadénome hypophysaire (non compressif), l'attitude officielle est de plus en plus, chaque fois que faire se peut, l'abstention thérapeutique ; donc ne pas hésiter à utiliser l'homéopathie.

Ces indications peuvent être :

**Gynécomastie - Mastodyn/es sévères** (voir p. 41) - **Ga/actorrhée (avec ou sans aménorrhée) - Hypofertilité** (voir p. 70) - **Impuissance**

- *Prolactinum* (bu Laccan/numJ 15 CH, 5 granules 1 à 2 fois par jour. En cas d'hyperprolactinémie vraie ou de prolactinémie limite, adjoindre *LH-RH* 15 CH et *Serotonnum* 75 CH, 1 fois de chaque par jour.

**Cas clinique** Une dame m'amène son fils Julien F., 12 ans et demi, qui a découvert « une boule » dans son sein gauche il y a 3 semaines. Il est inquiet et complexé par ce phénomène. Julien est en bonne santé par ailleurs et n'a pas de traitement en cours. À l'examen, il existe effectivement une tuméfaction sous-mamelonnaire sphérique de 2 cm de diamètre, douloureuse à la pression. Tous les caractères sexuels primaires et secondaires sont présents.

**Traitement**

- *Lac caninum* 15 CH, 5 granules 2 fois par jour.

Julien a été guéri en un mois (l'évolution spontanée de cette pathologie bénigne à l'adolescence se fait en général sur plusieurs mois pour arriver à la guérison).


d

### L'ACTH [*Adrenocorticotropin Hormone*]

- La souche homéopathique est d'origine porcine.
- Taux usuels : à 8 h du matin < 50 pg/ml.

Elle est stimulée par la CRH hypothalamique.

Elle stimule la synthèse et la sécrétion cortico-surrénaienne des glyco-corticoïdes (cortisol essentiellement) et de plusieurs androgènes.



### Usages homéopathiques

Pour certains types d'hypertension artérielle qui se développent en même temps qu'une hyperandrogénie, tableau que l'on peut rencontrer à la ménopause (voir chapitre sur l'hypertension artérielle, p. 84).

**Cas clinique** Mlle Joëlle M., 48 ans, consulte pour des problèmes rhumatologiques mineurs, dus à un début d'arthrose. Elle signale une ménopause à 45 ans qui a entraîné très peu de bouffées de chaleur, celles-ci s'étant amendées sans traitement. Mais depuis, elle a une tension artérielle souvent retrouvée entre 15 et 17 pour la maxima et 9 et 10 pour la minima, et une pilosité qui s'est nettement développée : moustache, menton, pattes et avant-bras.

# 3

## Les hormones gonadiques

### a

#### Les œstrogènes

> L'ovaire secrète trois types d'œstrogènes :

- l'œstriol,
- l'oestrone = folliculine = *Fo/Siculinum*,
- et surtout le 17 bêta cestradiol = *ŒstradoSium*, qui est l'œstrogène le plus important en quantité sécrétée et en activité biologique (les œstrogènes sont sécrétés aussi par le placenta, les testicules et le cortex surrénal).

> La souche homéopathique de *FollicuUnum* est d'origine végétale (soja), et on en termine la synthèse de manière chimique.

> Taux usuels :

- Chez la femme : Phase folliculaire : 21 à 120 pg/l.  
Phase lutéale : 57 à 200 pg/l.  
Ménopause : < 40 pg/l.
- Chez l'homme : < 40 pg/l

Les œstrogènes sont stimulés par la FSH.

Ils conditionnent le développement des caractères sexuels primaires et secondaires chez la femme.

Ils favorisent la prolifération de l'endomètre pour la nidation.


Ils stimulent la croissance de l'utérus gravide.

Ils stimulent la sécrétion vaginale et la glaire cervicale.

Ils favorisent la libido.

Ils favorisent la rétention hydrosodée intracellulaire.

Il y a deux pics d'œstrogènes dans le cycle : vers le 8<sup>e</sup> et le 20<sup>e</sup> jour.



## Usages homéopathiques

En homéopathie, du fait d'une erreur historique, on croyait que la folliculine était le principal œstrogène, et on prescrit traditionnellement *Folliculinum*.

### **Syndrome prémenstruel de type hyperœstrogénique relatif**

- *Folliculinum 15 CH*, 1 dose le 8<sup>e</sup> et le 20<sup>e</sup> jour du cycle.
- Voir chapitre correspondant, p. 41.

### **Algoménorrhée dans un climat d'hyperœstrogénie relative**

- *Folliculinum 15 CH*, 1 dose le 8<sup>e</sup> et le 20<sup>e</sup> jour du cycle.
- Voir chapitre correspondant, p. 47.

### **Toute pathologie liée aux œstrogènes : fibrome, kyste fonctionnel de l'ovaire, endométriose, ménométrorragies...**

- *Folliculinum 15 CH*, 5 granules 1 fois par jour.

## b

### **La progestérone**

> La souche homéopathique est d'origine végétale (soja), et on en termine la synthèse de manière chimique.

> Taux usuels :

- Chez la femme : Phase folliculaire : 0,2 à 0,8 ng/ml.  
Phase lutéale : 1 à 4 ng/ml.
- Chez l'homme : < 2,5 ng/ml.

La progestérone est sécrétée essentiellement par le corps jaune, donc après ovulation, et elle dépend donc de la production de LH.

Elle est également sécrétée par le placenta à partir du 2<sup>e</sup> mois de grossesse, par le cortex surrénal et par les testicules. Elle prépare la phase sécrétoire de l'endomètre, au préalable sensibilisé par les œstrogènes.

Elle a une action inhibitrice sur le tonus et la contractibilité du muscle utérin. Elle développe et maintient le placenta.

# D

## Les endométrioses

Par définition, c'est la présence hétérotopique d'endomètre : adénomyose, tubaire, péritonéo-ovarienne, externe (vulve, périnée, abdominale, urinaire, thoracique...).

Les lésions endométriosiques sont sous la dépendance des œstrogènes qui les entretiennent.

On retrouve dans le liquide péritonéal - en cas de forme génitale externe - des macrophages, des prostaglandines et des stéroïdes.

C'est une pathologie fréquente qui doit toujours être évoquée devant une algoménorrhée secondaire ou une hypofertilité. Ce sont là les deux principaux motifs de consultation.

### 1

#### Traitement homéopathique

Les lésions endométriosiques sont de véritables tumeurs chroniques. Il faut donc toujours donner un médicament de mode réactionnel sycotique :

- *Thuja occidentalis* ou *Medorrh/num*, si l'on a la notion d'infection génitale fréquente, en dose de 30 CH hebdomadaire, ou *Nitricum acidum*, pour les localisations (col, vulve, narine), en dose de 30 CH hebdomadaire.

La dépendance de l'endométriose aux œstrogènes doit faire prescrire, en cas d'insuffisance de résultats en quelques mois :

- *Folliculinum 15 CH*, voire *Œstradiolum 15* ou 30 CH, 5 granules tous les jours.

Adjoindre un traitement de douleurs de règles, essentiellement :

- *Prostaglandine F2* et *Prostaglandine E2* en 75 CH, 5 granules de chaque à la demande, ou tout autre médicament vu au chapitre des algoménorrhées (voir p. 49).

*Actaea racemosa* sera souvent indiqué puisque, dans sa pathologie, on retrouve des douleurs proportionnelles au flux menstruel.

comme dans les endométrioses, et qu'il a une action anticestrogène. Adjoindre également un médicament de type sensible à rechercher surtout dans le climat hypercestragénique.

**Cas clinique** Mme Danielle M., 31 ans, consulte pour une endométriose qui vient d'être diagnostiquée à la suite de douleurs pelviennes chroniques.

#### **Interrogatoire**

La coelioscopie a montré une cavité pelvienne très congestive, un épanchement péritonéal au niveau du Douglas ; celui-ci présente aussi des lésions endométriosiques, tout le reste de la surface du péritoine présente de petites lésions endométriosiques. Par ailleurs, elle se dit fatiguée, présente des problèmes digestifs à type de constipation et de pesanteur postprandiale.

Elle a été réglée à 14 ans ; ses cycles sont de 28 à 35 jours ; ses règles sont abondantes, durent 7 à 10 jours et sont au maximum le 2<sup>e</sup> et le 3<sup>e</sup> jour. Les douleurs pelviennes sont au maximum du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> jour, à type de crampes.


Il existe aussi, 10 jours avant les règles, un syndrome prémenstruel fait de mastodynies.

Dans les antécédents, on note de très nombreux problèmes ORL de l'enfance.

#### **Traitement (6 mois)**

- *Tuberculinum 30 CH* et *Sulfur iodatum 30 CH*, 1 dose chaque dimanche en alternance.
- *Folliculinum 15 CH*, 5 granules le matin.
- *Thuya occidentalis 15 CH*, 5 granules le soir.
- *Prostaglandine E2 15 CH* et *Prostaglandine F2 15 CH*, 5 granules de chaque à la demande.

Revue 6 mois après : les règles sont beaucoup moins abondantes, beaucoup moins douloureuses et très vite calmées par *Prostaglandine F2* et *E2*. On vient de lui faire une nouvelle coelioscopie qui montre beaucoup moins de noyau endométriosique.



Aimé Holtzscherer

Thérapeutique hormonale  
homéopathique

92 pages, pb  
publication 2011



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life [www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)